DIPLOMADO
Actualidades en
**Enfermería
Nefrológica**

PONENTE EEN Ricardo Galván López

TEMA: MODULO1 Enfermería Nefrológica

FECHA: Sábado 12 de abril 2025

INTRODUCCIÓN

El gran desarrollo experimentado por la Nefrología en los últimos años como especialidad independiente, ha traído como consecuencia el que un elevado número de profesionales se hayan dedicado a este campo de la ciencia haciendo importantes contribuciones.

CONTENIDO

- 1.1 Perfil profesional de la enfermera nefrológica
- 1.2 Funciones y campos de aplicación
- 1.3 Epidemiología de la Enfermedad Renal Crónica
- 1.4 Situación actual de la Enfermería Nefrológica en México
- 1.5 Marco legal, normativo y responsabilidad profesional

TEMA 1.1 PERFIL PROFESIONAL DE LA ENFERMERÍA NEFROLÓGICA

A nivel mundial, se ha demostrado un incremento en la prevalencia e incidencia de la Enfermedad Renal Crónica (ERC). En términos de incidencia, de 92 pacientes por millón de habitantes (ppmh) reportados en 1999, aumentó a 372 ppmh en el año 2007

El **costo de los tratamientos** para las enfermedades crónicas alcanza el 80% del presupuesto en salud.

Programas de prevención

Terapias de Reemplazo Renal

Actualización de los profesionales de salud.

Prolongar cuidado y
tratamiento
Autocuidado

La **EPA** se basa en

1. Formación integral
2. Prevención
3. Limitación del daño
4. Acciones específicas en el tratamiento y rehabilitación

TEMA 1.1 PERFIL PROFESIONAL DE LA ENFERMERÍA NEFROLÓGICA

Perfil académico en **cuatro** áreas de formación

Terapias dialíticas en sus diferentes modalidades.

HD DP

Enfermedad Renal Crónica

Enfermedad Renal Aguda

Enfermedad Renal Crónica Agudizada

Cuidado de calidad y humano

Realización de intervenciones interdependientes en programas de donación.

- **Trasplante renal**
- **Protocolo de trasplante**
- **Cuidados preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio,**

Programas de procuración, preservación y conservación de órganos y tejidos con fines de trasplante.

Centro Nacional de Trasplante

Atención ambulatoria basada en la enseñanza

- “Autocuidado”
- DPCA, DPA
- Polifarmacia, uso de inmunosupresores, reemplazo hormonal
- Nutricional
- Medidas de seguridad en la prevención y manejo de infecciones.

Habilidades y de actitudes que enmarcan un actuar responsable, honesto y humanístico

López Cervantes, M. Estudio de insuficiencia renal crónica y atención mediante tratamiento de sustitución. Secretaria de Salud-Subsecretaria de Innovación y Calidad-Facultad de Medicina UNAM, 2009.

Demanda del contexto.

Se estima que aproximadamente 60 mil personas mueren de ERC.

2025, habrá cerca de 212 mil casos y se registrarán casi 160 mil muertes relacionadas

Enfermedades infecciosas
Desnutrición

Doble morbilidad

TSR

En la actualidad, el 60% de los pacientes tratados reciben diálisis peritoneal, mientras que el 40% hemodiálisis,

- Costos
- Falta de infraestructura
- Nivel de deterioro orgánico

Prevalencia de pacientes incrementa

- Longevidad
- Diabetes Mellitus
- Hipertensión arterial
- Arterioesclerosis
- Colagenopatías

Se calcula que existen, por lo menos, ocho millones de personas con ERC; de las cuales, cerca de 40 mil se encuentran en algún programa de diálisis.

Diagnóstico temprano y tratamiento oportuno
Tamizaje

Toxinas urémicas

Filtrado Glomerular

Déficit de autocuidado

Rechazo

Disfunción sexual

CUIDADO NEFROLÓGICO DE ENFERMERÍA

- Reflexión
- Análisis crítico
- Juicio clínico
- Organización de recursos
- Evaluación de la calidad de las intervenciones
- Creencias y valores

Ciencia y Arte

- Cambios de estilo de vida
 - Dieta
 - Descanso
 - Actividad física
 - Medicación
 - Monitoreo
 - Decisiones

SISTEMAS DE ENFERMERÍA

1. Totalmente compensatorio
2. Parcialmente compensatorio
3. Apoyo educativo.

Dorotea Orem

Autosuficiencia del paciente

Participación del
cuidador primario
(familiar responsable)

DIÁLISIS PERITONEAL

Incremento de pacientes
Supervivencia relativa

Transporte de difusión para la separación de moléculas de diferente peso y concentración.

Las diversas modalidades se individualizan de acuerdo a las características de la membrana peritoneal de cada paciente (**tipo de transportador**), necesidades y la existencia de **función renal residual**.

DP

DPCA

HEMODIÁLISIS

Técnica y tecnología

“Saber hacer”

Proporcionar cuidados, resolver situaciones, contribuir al bienestar y mantenimiento de la vida.

La **hemodiálisis moderna** tiene la capacidad de realizarse en hospitales, unidades ambulatorias y en el domicilio del paciente.

Transporte difusivo con membranas de alta permeabilidad.

Hemodiafiltración

Intervención en crónicos, agudos, crónicos-agudizados.

TRASPLANTE RENAL

Mayor supervivencia de los pacientes

Técnicas quirúrgicas, inmunosupresores y tratamientos antimicrobianos desarrollando la supervivencia del paciente y funcionalidad del injerto.

**Procuración
Donación**

Maximizar los recursos, mejorar los resultados y promover la donación.

DONACIÓN Y PROCURACIÓN DE ÓRGANOS CON FINES DE TRASPLANTE

En nuestro país, la cultura de donación de órganos se observa como un **hecho aislado**

En los servicios de salud la falta de coordinación para la preparación de los aspectos médicos, legales o administrativos retrasan o dificultan la realización en tiempo y forma de la donación cadavérica.

La procuración, preservación de órganos y tejidos, son aspectos que interfieren significativamente en el número de donaciones cadavéricas y el número de trasplantes que se puedan llevar a cabo.

En 2017, se registraron 697,5 millones de casos de ERC en todos los estadios, para una prevalencia global del 9,1%.

La tasa de mortalidad global por ERC para todas las edades aumentó un 41,5% entre 1990 y 2017.

La prevalencia global de ERC en todas las edades aumentó un 29,3%.

Bangladesh, Brasil, Indonesia, Japón, México, Nigeria, Pakistán, Rusia, Estados Unidos y Vietnam tenían más de 10 millones de casos de ERC cada uno

En 2017, 1.2 millones de personas murieron de ERC.

En 2017, se reportó una prevalencia de ERC del 12.2% y 51.4 muertes por cada 100 mil habitantes en México.

La cifra anual presentada en México sobre incidencia es de aproximadamente 45 mil individuos (346 por millón de habitantes).

La prevalencia es de 188 mil (mil 447 personas por millón de habitantes)

Se ha estimado que, en la actualidad, alrededor de 6.2 millones de mexicanos con diabetes tienen enfermedad renal en sus distintas etapas, sin que necesariamente todos ellos sepan que la padecen

Hasta 2018, se conocía que la población mexicana tuvo conocimiento de:

- 10.3% que padecía diabetes.
- 18.4% padecía hipertensión arterial.
- 40% padecía obesidad.

CONCEPTO

Alteración estructural o funcional del riñón por > 3 meses que tiene implicaciones para la salud (KDIGO 2023).

Disminución de la función renal demostrada por la tasa de filtrado glomerular (GFR) de menos de 60 mL/min en 1.73 m², o por marcadores de daño renal, o ambas, de al menos 3 meses de duración, sin tomar en cuenta la causa subyacente.

KDIGO

GPC

Markers of kidney damage (one or more)	Albuminuria (AER ≥ 30 mg/g (≥ 3 mg/mmol)) Urine sediment abnormalities Electrolyte and other abnormalities due to tubular disorders Abnormalities detected by histology Structural abnormalities detected by imaging History of kidney transplantation
Decreased GFR	GFR < 60 ml/min per 1.73 m ² (GFR categories G3a-G5)

Table 1. Criteria for chronic kidney disease (CKD) (either of the following present for >3 months).

AER, albumin excretion rate; GFR, glomerular filtration rate

Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Renal Crónica. Guía de Evidencias y Recomendaciones: Guía de Práctica Clínica. México, CENETEC; 2019. Disponible en: <http://imss.gob.mx/profesionales>

KDIGO. Clinical practice Guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. 2023. Disponible en: https://kdigo.org/wp-content/uploads/2017/02/KDIGO-2023-CKD-GuidelinePublic-Review-Draft_5-July-2023.pdf

FACTORES DE RIESGO

FACTORES DE RIESGO

Domains	Example conditions
Common risk factors	Hypertension Diabetes Cardiovascular disease (including heart failure) Prior AKI
People who live in geographical areas with high prevalence of CKD	Areas with endemic CKDu Environmental exposures
Genitourinary disorders	Structural urinary tract disease Recurrent kidney calculi Gestational conditions
Multisystem diseases	Systemic lupus erythematosus Gout HIV Preeclampsia/eclampsia
Occupational exposures that promote CKD risk	Cadmium, lead, and mercury exposure Polycyclic hydrocarbons Pesticides
Family history	Kidney failure, regardless of identified genetic abnormality Hereditary kidney disease recognized to be associated with genetic abnormality (e.g., PKD, <i>APOL1</i> Disease, Alport syndrome)
Gestational conditions	Preterm birth Small gestational size Preeclampsia

ESTADIOS

Una vez diagnosticada la ERC se clasifica con base en el sistema

CGA
CAUSAS
TFG

ALBUMINURIA

Determinar **SEVERIDAD** y **RIESGO**

KDIGO 2012			Albuminuria		
			Categorías, descripción y rangos		
			A1	A2	A3
Filtrado glomerular			Normal a ligeramente elevada	Moderadamente elevada	Gravemente elevada
Categorías, descripción y rangos (ml/min/1,73 m ²)			< 30 mg/g ^a	30-300 mg/g ^a	> 300 mg/g ^a
G1	Normal o elevado	≥ 90			
G2	Ligeramente disminuido	60-89			
G3a	Lidera a moderadamente disminuido	45-59			
G3b	Moderada a gravemente disminuido	30-44			
G4	Gravemente disminuido	15-29			
G5	Fallo renal	< 15

Enfermería tiene grandes responsabilidades

Falta

Identidad profesional con más autonomía.

Reconocimiento de su labor de Enfermería como actividad básica y esencial en las instituciones de salud.

Bajos salarios.

Dobles jornadas de trabajo.

Falta de participación en la toma de decisiones.

Esta última se empieza a superar con la profesionalización, al incursionar en estudios de licenciatura, maestría y doctorado en Enfermería.

Históricamente el ejercicio de la enfermería esta relacionado.

Políticas Nacionales de salud

Curativas y prevención de las enfermedades.

¿QUÉ HA SUCEDIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS CON EL DESARROLLO DE LA NEFROLOGÍA EN MÉXICO?

En los años 70's se formalizan los programas de Diálisis Y TR

1.200 paciente en hemodiálisis, 12.000 s en diálisis peritoneal y sin un registro confiable de pacientes trasplantados (1992)

Mas unidades y mas modernas, los candados que existían en los criterios de inclusión exclusión a los programas aceptando a diabéticos y mayores de 60 años.

En los años 80's auge de la DPCA, menos estancia hospitalaria, colocando a México en primer lugar.

Altas complicaciones y sobrevida corta.

No se realizaban trasplantes por falta de cobertura en el programa.

En el IMSS la implementación de programas de DPI
DPCA
Entrenamientos en DPCA Y DPA

DESARROLLO DE LA ENFERMERÍA

Inicio de los programas de DP

Improvisar unidades
Capacitar al personal

Recursos monográficos mas constantes en la actualización en HD

Impacto en mejores resultados

Se inicia una etapa que es la preparación, los programas de educación continua se han empezado a desarrollar en una forma más estructurada y planeada a través de la integración docencia-servicio

Actualmente el número de enfermeras capacitadas a crecido y se trata en la mayoría de las instituciones de **no rolar al personal**

Se inicia el diplomando en Hemodiálisis por parte de la FESI UNAM

Años posteriores la Especialidad en Enfermería Nefrológica.

Mayor demanda no todos las enfermeras estaban preparadas para dar un entrenamiento adecuado a pacientes y familiar.

NOM-003-SSA3-2010

Objetivos

- Explicar la importancia de la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA3-2010 en la práctica de la hemodiálisis.
- Identificar los requisitos esenciales de infraestructura y equipamiento que deben cumplir las unidades de hemodiálisis.
- Describir el perfil del personal médico y de enfermería necesario para brindar una atención segura y eficiente. Resaltar la importancia del mantenimiento y monitoreo de la calidad del agua utilizada en el tratamiento.

NOM-003-SSA3-2010

Personal de salud

Médicos

- Prescribir tratamientos, manejar accesos vasculares y supervisar el tratamiento integral del paciente.
- Detectar y tratar complicaciones

- Informar a los pacientes y sus familias.
- Asegurar el cumplimiento de normas de calidad y seguridad.

- Capacitar al personal.
- Supervisar equipos y calidad del agua.

NOM-003-SSA3-2010

Personal de salud

Enfermería

- Valorar al paciente antes, durante y después del procedimiento.

- Manejo de accesos vasculares y monitoreo de signos vitales..

Supervisar la calidad del agua y equipos.

- Registrar datos clave del tratamiento

- Participar en visitas médicas y cuidados post-hemodiálisis.

Preferentemente especializado en nefrología o con capacitación mínima de seis meses.

NOM-003-SSA3-2010

Medidas de prevención y control de infecciones.

- Pruebas serológicas a pacientes nuevos y controles periódicos.

- Uso de equipos separados para pacientes seropositivos y seronegativos.

- Desinfección rigurosa de equipos y áreas.

- Vacunación contra la hepatitis B.

- Aplicación de medidas de bioseguridad, como uso de guantes y caretas.

- Manejo adecuado de residuos biológicos..

El personal de salud y las unidades de hemodiálisis deben aplicar protocolos estrictos para prevenir infecciones como hepatitis B y C y VIH.

NOM-003-SSA3-2010

Establecimiento.

Máquina de hemodiálisis que deberá tener los registros y alarmas básicas siguientes:

- Temperatura del dializante
- - Flujo de sangre
- - Flujo de dializante;
- - Conductividad o concentración del dializante
- - Volumen de ultrafiltración
- - Presión venosa y arterial
- - Detector de aire y de fuga de sangre
- - Módulo de bicarbonato

Planta de tratamiento de agua con calidad para el empleo en hemodiálisis, que conste de:

- - Pre-filtros
- - Ablandadores
- - Carbón activado
- - Osmosis inversa
- - Filtro de luz ultravioleta (optativo).

Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA3-2010.

NOM-003-SSA3-2010

Apéndice .

Apéndice Normativo "B"

Criterios para el reprocesamiento de los filtros de diálisis.

B.1. Debe existir la carta de consentimiento informado del paciente para ser incluido en el plan de reprocesamiento y deberá ser informado de las condiciones de los filtros de diálisis.

B.2. El etiquetado del filtro de diálisis deberá contar con el nombre del paciente, fecha de primer uso y el número de reprocesamientos, lo cual junto con la fecha del último reprocesamiento y el nombre de quien lo realizó, quedará registrado en la bitácora de la unidad.

B.3. Una vez lavado y esterilizado, el filtro de diálisis será almacenado en un lugar fresco y resguardado de la luz para evitar la proliferación de microorganismos.

B.4. Previo al comienzo de la diálisis, enjuagar el filtro de diálisis cerciorándose por medio de procedimientos específicos de la ausencia de residuos del material esterilizante de acuerdo a cada tipo de agente utilizado, que en su caso, deberá ser reprocesado.

B.5. Los filtros de diálisis de fibra hueca podrán ser reutilizados un máximo de 12 veces, mientras mantengan un volumen residual no inferior al 80% del medido inicialmente y se compruebe la integridad del mismo, a través de la ausencia de fuga aérea o hemática.

B.5.1. En el caso de pacientes seropositivos al virus de la hepatitis B o de la inmunodeficiencia humana, no se deberán reutilizar los filtros de diálisis.

B.6. El nefrólogo a cargo de la unidad de hemodiálisis es el responsable de la elección de la metodología a seguir y de sus consecuencias.

B.7. Queda prohibido el reprocesamiento de agujas y líneas arteriovenosas.